AMBULANTE PFLEGE · NEUROLOGISCHE CHRONISCHE ERKRANKUNGEN

Amyotrophe Lateralsklerose

FACHLICH GEPRÜFT 18.11.2026

> MERKE
> Bei ALS früh über Atmung, Ernährung und Lebensende sprechen – solange Sprechen noch möglich ist.

Die motorischen Nervenzellen in Gehirn und Rückenmark gehen fortschreitend zugrunde. Dadurch werden Muskeln für Arme, Beine, Sprechen, Schlucken und Atmen immer schwächer; Gefühl und meist auch Denken bleiben erhalten und.

Leitsymptome

- Lähmungen mit Muskelschwund, Faszikulationen (Muskelzuckungen), Krämpfe, Spastik; Sprech- und Schluckstörung (Dysarthrie, Dysphagie), vermehrter Speichelfluss (Sialorrhö), zäher Schleim, Atemschwäche, emotionale Labilität (pathologisches Lachen/Weinen), Depression, Schmerzen .

Pflege: Beobachtung

- Atmung (Atemnot im Liegen, Morgenkopfschmerz, Tagesmüdigkeit als Hypoventilationszeichen), Schlucken, Gewicht, Speichel, Kommunikation, Stimmung, Hautzustand (Atmung, Gewicht) und (Hypoventilationszeichen).

Komplikationen und Warnzeichen

- Akute Atemnot, Verschlucken mit Atemnot, Pneumonie -> 112 bzw. vereinbarten Notfallplan/SAPV befolgen, sofern Patientenverfügung Intensivtherapie ablehnt **(Patientenverfügung) und** Einschätzung.

GANZER BEITRAG · ERKLÄRUNGEN · QUELLEN

stationsfuchs.de/krankheitsbilder/amyotrophe-lateralsklerose

Kostenlos lernen ohne Anmeldung: Quiz, Laborwerte, Pflegeplanung und mehr auf stationsfuchs.de

Lernhilfe für die Ausbildung. Ersetzt keine Leitlinie, keinen Standard und keine ärztliche Anordnung.
Darf frei kopiert, gedruckt und weitergegeben werden. Nicht verändern, nicht verkaufen. © Meshor GmbH