KRANKENHAUS · BAUCH

Cholezystitis und Cholelithiasis

FACHLICH GEPRÜFT 18.11.2026

> MERKE
> Gallensteine ohne Beschwerden werden meist nicht operiert, eine akute Cholezystitis dagegen früh.

Gallensteine (Cholelithiasis) bilden sich in der Gallenblase oder in den Gallengängen. Klemmt ein Stein, entsteht eine Kolik; entzündet sich die Gallenblase, spricht man von Cholezystitis; ein Stein im Hauptgallengang kann Gelbsucht, Cholangitis oder Pankreatitis auslösen.

Leitsymptome

- Gallenkolik: Schmerzattacken länger als 15 Minuten im Oberbauch Mitte oder rechts, oft in die rechte Schulter ausstrahlend.
- Cholezystitis: anhaltender Schmerz rechter Oberbauch, Fieber, Druckschmerz (Murphy-Zeichen); Entzündungszeichen und Wandverdickung im Ultraschall.
- Choledocholithiasis/Cholangitis: Gelbsucht, dunkler Urin, heller Stuhl, Fieber mit Schüttelfrost (Charcot-Trias).

Pflege: Beobachtung

- Schmerz, Temperatur, Haut- und Skleren-Farbe (Ikterus), Urin- und Stuhlfarbe, Vitalzeichen, Übelkeit/Erbrechen. Nach OP: Wunde/Trokareinstiche, Drainage (Menge, Aussehen – Galle, Blut), Schulterschmerz nach Laparoskopie (CO2), Kostaufbau.

Komplikationen und Warnzeichen

- Gallenblasenempyem, Perforation, Cholangitis, biliäre Pankreatitis, Sepsis -> Fieber mit Schüttelfrost, Gelbsucht, zunehmende Schmerzen = sofort Ärztin/Arzt.

GANZER BEITRAG · ERKLÄRUNGEN · QUELLEN

stationsfuchs.de/krankheitsbilder/cholezystitis-und-cholelithiasis

Kostenlos lernen ohne Anmeldung: Quiz, Laborwerte, Pflegeplanung und mehr auf stationsfuchs.de

Lernhilfe für die Ausbildung. Ersetzt keine Leitlinie, keinen Standard und keine ärztliche Anordnung.
Darf frei kopiert, gedruckt und weitergegeben werden. Nicht verändern, nicht verkaufen. © Meshor GmbH