KRANKENHAUS · ONKOLOGIE

Mammakarzinom (ICD-10-GM C50) – kurzes Profil

FACHLICH GEPRÜFT 18.11.2026

> MERKE
> Nach Brustkrebs-OP mit Achsellymphknotenentfernung den Arm der operierten Seite vor Verletzungen und Einschnürung schützen.

Bösartiger Tumor der Brustdrüse, häufigste Krebserkrankung der Frau; selten auch bei Männern.

Leitsymptome

- Tastbarer Knoten, Einziehung von Haut oder Brustwarze, Sekret, Hautveränderungen (Orangenhaut), Lymphknoten in der Achsel.

Pflege (Beobachtung, Maßnahmen)

- Wunde und Drainagen, Schulterbeweglichkeit (Physiotherapie früh), Lymphödemrisiko am Arm der operierten Seite (Hautschutz, Verletzungen vermeiden, auf Schwellung achten), Körperbild, Brustprothese/BH-Versorgung, psychoonkologische Unterstützung, Breast Care Nurse.

Komplikationen und Warnzeichen

- Lymphödem, Wundinfekt/Serom, Rezidiv, Metastasen (Knochen, Leber, Lunge, Gehirn).

GANZER BEITRAG · ERKLÄRUNGEN · QUELLEN

stationsfuchs.de/krankheitsbilder/mammakarzinom

Kostenlos lernen ohne Anmeldung: Quiz, Laborwerte, Pflegeplanung und mehr auf stationsfuchs.de

Lernhilfe für die Ausbildung. Ersetzt keine Leitlinie, keinen Standard und keine ärztliche Anordnung.
Darf frei kopiert, gedruckt und weitergegeben werden. Nicht verändern, nicht verkaufen. © Meshor GmbH