PFLEGEHEIM · INFEKTIONEN IM PFLEGEHEIM

Skabies

FACHLICH GEPRÜFT 18.11.2026

> MERKE
> Gegen Krätzmilben hilft kein Händedesinfektionsmittel – Handschuhe, Kittel, Händewaschen und alle Kontaktpersonen gleichzeitig behandeln.

Befall der Hornschicht der Haut mit der Krätzmilbe (Sarcoptes scabiei var. hominis), die Gänge gräbt.

Leitsymptome

- Starker Juckreiz, nachts schlimmer; Milbengänge v. a. an Fingerzwischenräumen, Handgelenken, Genitalbereich. Scabies crustosa (borkige Skabies): dicke Krusten, sehr viele Milben, extrem ansteckend, Juckreiz kann fehlen. Inkubationszeit: Erstbefall 2–5 Wochen, Wiederbefall 1–4 Tage. Bei alten, bettlägerigen Menschen oft untypisch (Rücken, Gesäß) und lange verkannt (z. B. als „Altersjucken“ oder Ekzem).

Pflege: Beobachtung

- Juckreiz, Kratzspuren, Hautveränderungen bei Bewohnern und Kontaktpersonen; Wirkung der Behandlung, Kontrolle nach Therapie.

Komplikationen und Warnzeichen

- Bakterielle Superinfektion der Kratzwunden (Rötung, Eiter, Fieber) -> Ärztin/Arzt; unerkannte Scabies crustosa als Ausbruchsquelle.

GANZER BEITRAG · ERKLÄRUNGEN · QUELLEN

stationsfuchs.de/krankheitsbilder/skabies

Kostenlos lernen ohne Anmeldung: Quiz, Laborwerte, Pflegeplanung und mehr auf stationsfuchs.de

Lernhilfe für die Ausbildung. Ersetzt keine Leitlinie, keinen Standard und keine ärztliche Anordnung.
Darf frei kopiert, gedruckt und weitergegeben werden. Nicht verändern, nicht verkaufen. © Meshor GmbH