PFLEGE IM ALLTAG · HYGIENE & INFEKTIONSSCHUTZ

Soor- und Parotitisprophylaxe: Maßnahmen und Mundpflege

FACHLICH GEPRÜFT 22.11.2026

	SOOR	PAROTITIS
Was	Pilzinfektion (Candida albicans)	Entzündung der Ohrspeicheldrüse
Zeichen	weiße, abwischbare Beläge, Brennen	Schwellung vor dem Ohr, Kauschmerz, Fieber
Risiko	Abwehrschwäche, Antibiotika, Kortison, Prothese	wenig Speichel, kein Kauen, Sonde, Austrocknung
Vorbeugen	Mundpflege, Inspektion, Prothese reinigen	Kauen und Trinken fördern, Mund feucht halten

- **Inspektion:** Lippen, Zunge, Wangen, Gaumen, Zähne, Zahnfleisch, Speichel, Prothese, Bereich vor dem Ohr.
- **Material:** Handschuhe, Lampe, Spatel, weiche Zahnbürste, Zahnpasta mit Fluorid, Tupfer mit Klemme, Lippenpflege, ggf. Absaugung.
- **Ablauf:** informieren, Oberkörper hoch, Prothese raus, inspizieren, Zähne putzen, Schleimhaut von hinten nach vorn, Lippen pflegen, dokumentieren.

MERKE
Wo Zähne sind, gehört eine Zahnbürste hin. Tupfer ergänzen sie nur.

MERKE
Kauen regt Speichel an, aber nur, wenn der Mensch sicher schlucken kann.

MERKE
Weiße Beläge oder eine Schwellung vor dem Ohr meldest du sofort. Die Behandlung ordnet der Arzt an.

GANZER BEITRAG · ERKLÄRUNGEN · QUELLEN

stationsfuchs.de/blog/soor-und-parotitisprophylaxe

Kostenlos lernen ohne Anmeldung: Quiz, Laborwerte, Pflegeplanung und mehr auf stationsfuchs.de

Lernhilfe für die Ausbildung. Ersetzt keine Leitlinie, keinen Standard und keine ärztliche Anordnung.
Darf frei kopiert, gedruckt und weitergegeben werden. Nicht verändern, nicht verkaufen. © Meshor GmbH